

# Care Max

Adulto 

Tabletas Masticables

"USO VETERINARIO"

## Desparasitante oral de amplio espectro para perros y gatos



Presentación:

**2 Tabletas**

CARE MAX es un antihelmíntico y giardicida que contiene como sustancias activas el derivado de la tetrahidropirimidina pirantel (en forma de sal pamoato), el pro-bencimidazol febantel y prazicuantel, un derivado pirazinoisoquinolínico parcialmente hidrogenado. Es activo frente a ciertos nematodos, cestodos (tenias) y Giardia spp. en perros y gatos.



# Care Max

Adulto 

Especie	Vía de administración
Caninos y felinos domésticos 	Oral

## Beneficios y Ventajas:

- Antihelmíntico de amplio espectro.
- Con sabor a carne de res.
- Aplicación de una sola toma.
- La perfecta combinación de sus ingredientes activos actúa eficazmente contra nemátodos, cestodos y giardia.
- No contiene ivermectina, lo que permite su aplicación en perros pastores (pastor inglés, pastor australiano, pastor alemán...), collies (Collie de pelo largo, border collie...), Galgo afgano, entre otros.
- Se puede administrar directamente o mezclado con la comida.
- En zonas de alto riesgo de infestación se recomienda desparasitar cada 3 meses.

## Advertencias

- No se utilice simultáneamente con compuestos de piperazina.
- No usar conjuntamente con otros vermífugos con propiedades colinérgicas, como el levamisol, pues puede producirse una potencialización de esta actividad producida por el pamoato de pirantel.
- Protéjase de la luz y manténgase en un lugar seco.
- No se deje al alcance de los niños.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

## Contraindicaciones

- El febantel y el prazicuantel están contraindicados en pacientes hipersensibles a los fármacos.
- Usar con precaución en los pacientes con insuficiencia hepática o enfermedad hepática.
- No utilizar en perras o gatas embarazadas.
- No usar durante los dos primeros tercios de la gestación ya que no se han realizado suficientes estudios en perras en estas fases de la gestación.

Nota: Consultar al Veterinario que le asista, para estimar las dosis del producto.

## Fórmula

Cada tableta de 1 g contiene:

Febantel .....	150 mg
Prazicuantel .....	80 mg
Pamoato de pirantel .....	125 mg
Excipientes c.b.p .....	1 tableta

## Recomendaciones

- No muela las tabletas recubiertas, ya que el pirantel tiene un sabor amargo.
- Permitir el acceso al agua en todo momento.

## Indicaciones

**CARE MAX** por su amplio espectro, es útil para el tratamiento contra Nematodos: *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma brasiliense*, *Capillaria spp.*, *Toxocara canis*, *Toxocara leonina*, *Toxocara cati*, *Trichuris vulpis*, *Oncicola canis*, *Uncaria stenocephala*, *Dipetalomena reconditum*, *Joyeuxiella pasquelei*, *Spirocerca lupi*, y *Strongyloides stercoralis*; Cestodos: *Ascaris sp.*, *Dypilidium caninum*, *Taenia hydatigena* y otras especies de *Taenia*, *Physalopetera sp.*, *Echinococcus granulosus* y *Echinococcus multilocularis* y *Giardiasis*.

## Dosis

### Tratamiento de larvas adultas y larvales de cestodos y nematodos. Dosis única.

Perros y gatos de 5 Kg ½ tableta. Perro y gatos de 10 Kg: 1 tableta. Perros de 15 Kg: 1½ tableta. Perros de 20 Kg: 2 tabletas. Perros de 30 Kg: 3 tabletas. Perros de 40 Kg: 4 tabletas. Perros de 50 Kg: 5 tabletas. Equivalente a Febantel 15 mg/kg, Prazicuantel 8 mg/kg y Pamoato de pirantel 12.5 mg/kg.

### Tratamiento para Giardiasis. Dosis única.

Perros y gatos de 5 Kg 1 tableta. Perro y gatos de 10 Kg: 2 tableta. Perros de 15 Kg: 3 tableta. Perros de 20 Kg: 4 tabletas. Perros de 30 Kg: 6 tabletas. Perros de 40 Kg: 8 tabletas. Perros de 50 Kg: 10 tabletas. Equivalente a Febantel 30 mg/kg, Prazicuantel 16 mg/kg y Pamoato de pirantel 25 mg/kg.

### GARANTÍA

Debido a que sale del alcance de BIOCHEM SYSTEMS, S.A. DE C.V. la empresa no se hace responsable por el mal uso del producto si se mezcla con productos incompatibles, ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en la etiqueta del producto.

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES. Las contraindicaciones e incompatibilidad se encuentran descritos en la etiqueta del producto.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.